

TRANSMURAAL VERLOSKUNDIG PROTOCOL

SEROTINITEIT

Auteur: Maatschap gynaecologen GV / eerste lijn verloskundigen kring GV

Doel: Bepalen eenduidig beleid in eerste lijn en reden voor verwijzing naar de tweede lijn bij dreigende serotiniteit.

Beschrijving beleid tweede lijn ter informatie van de cliënte

Werkwijze:

Zwangerschapsdatering d.m.v. echoscopische parameters zoals beschreven in het transmurale protocol datering van de zwangerschap.

1^e lijn

- Consult regelen bij *uiterlijk* AD 41.5 weken, geen verschil tussen primipara/multipara
- Indien dit in het weekend valt, afwegen voor of na weekend
- Te regelen via polikliniek digitaal of op de dag zelf via T: 0318 435861
- Vanuit eerste lijn wordt er gestript vanaf 41 weken
- Overname vanaf 42.1 weken

2^e lijn

- Na 42.0 weken dagelijks consult
- Niet standaard bij 42.1 inleiding, afhankelijk van bevindingen
- Tussen week 41 en 42 wordt verzoek tot inleiding van de ouders gehonoreerd mits er sprake is van een rijpe portio

Deze werkwijze zal voorlopig worden aangehouden in afwachting van de resultaten van de Index studie* waar enkele eerste lijns praktijken en de 2^e lijns obstetrie divisie van het Gelderse Vallei Ziekenhuis aan meewerken.

*Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats van bij 42 weken.